



Krew pełna (KP)

Jednostka krwi pełnej ma objętość około 500 ml i zawiera około 450 ml krwi i 50 ml płynu konserwującego.

Wskazania do stosowania:

Stosowanie KP powinno być ograniczone do dużych krwawień z utratą ponad 25% objętości krwi krążącej. Nie należy stosować KP u pacjentów z niedokrwistością, u których konieczne jest jedynie zwiększenie zdolności przenoszenia tlenu. Nie należy stosować KP do korygowania poziomów czynników krzepnięcia lub liczby krwinek płytkowych i białych. Nie należy stosować u pacjentów normowolemicznych. Także w przypadku masywnych krwawień zalecamy stosowanie koncentratu czerwonych krwinek i świeżo mrożonego osocza zamiast krwi pełnej.

Dawkowanie i sposób użycia:

12-20 ml/kg m.c.

KP podaje się po ogrzaniu do temperatury ciała. Nie wolno podgrzewać w kuchenkach mikrofalowych. Nie wolno podgrzewać do temperatury wyższej niż 40°C. Do transfuzji należy używać specjalnych zestawów z filtrami. Worka z krwią lub preparatem krwiopochodnym nie wolno nakłuwać w celu przyspieszenia przepływu. Nigdy nie dodajemy do krwi i jej preparatów żadnych leków. Równocześnie ze składnikiem krwi można przetaczać jedynie fizjologiczny roztwór NaCl. Czas przetaczania KP nie powinien jednorazowo przekraczać 4 godzin.

Przechowywanie i data ważności:

KP przechowujemy w temperaturze od +2°C do +6°C. Termin ważności wynosi do 42 dni.

Weterynaryjny Bank Krwi im. Milusia

tel. **511 501 500**

www.krewdlapsa.com

www.facebook.com/wetbankkrwi